


Szülőknek, gondviselőknek: COVID-19 döntési folyamat gyermekek esetén

4 fő tünet: láz (38.0 °C felett), újonnan fellépő vagy romló köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglászvesztés, ízézés hiánya vagy ízézés zavara
 Lehetséges tünetek: torokfájás, hányinger, hányás, hasmenés, izomfájdalom, fáradékonyság, újonnan fellépő/erős fejfájás, újonnan fellépő orrdugulás, orrfolyás



* Beteg gyermek elkülönítése: a tünetek kezdetétől számított legalább 10 nap. Amennyiben gyógyszer nélkül 3 napja láztalan, tünetei megszűntek, közösségbe mehet. Kontroll mintavétel nem indokolt.

** Testvérek, egy háztartásban élők elkülönítése: a COVID-19 pozitív beteggel történt utolsó kontaktus idejétől számított 10 nap

*** Az NNK döntésétől függően szoros kontaktnak minősülnek: pl. egy háztartásban élő családtag, osztálytárs, bölcsődei/óvodai csoporttárs, érintett közösség pedagógusa, egyesületi edzőtárs, különórai csoporttárs

Dr. Tordas Dániel, Dr. Bogdányi Katalin 2020.11.02.